El método favorito de cribado de diabetes...

Según ADA la glucemia basal normal es menor de..

Según la guía de la ADA y los endocrinos americanos, hipoglucemia es por debajo de..

No se hereda la diabetes tipo...

La sobrecarga de glucosa para el diagnostico de DM 2 se hace con..... de glucosa

La glucemia basal alterada y la tolerancia alterada a la glucosa son situaciones de

Una glucemia basal entre 100 y 126 es

Una glucemia tras SOG de 75 gr entre 140 y 200 es

Dos glucemias basales mayores de 126 es diagnostico de..

El diagnostico de DM 2 se hacen con dos muestras diferentes de Hb a1c mayores o iguales a

Cualquier método diagnostico de DM 2 menos la glucemia al azar mayor de 200 mg con síntomas

El diagnóstico de riesgo aumentado de diabetes se hacen con una HB A1c entre

El cribado de diabetes gestacional se hace con...

El test de O'sullivan es de...

Cuantos valores por encima de los de referencia en la SOG con 100 gr. se consideran diagnostico de diabetes gestacional en el 3er workshop

El diagnostico de DM 2 debe hacerse en

La base etiopatiopatogénica de la diabetes 1 es

La base etiopatiopatogénica de la diabetes 2 es

La insulina se secreta por la célula

El glucagón se secreta por la célula

La glucosa se almacena a nivel hepático en forma de

De forma generica según la ADA se considera buen control una Hb A1c menor de

De forma generica según la ADA, una Hb A1c menor de 6.5% se considera el objetivo de control en ...

De forma generica según la ADA, una Hb A1c menor de 7.5% se considera el objetivo de control en ...

En un paciente con corta esperanza de vida el objetivo de Hb A1c será de.....

El objetivo de control y tratamiento de la DM 2 serán según el enfoque centrado en el paciente

Según ADA la glucemia basal capilar objetivo estará entre..

En los algoritmos SED, ADA y redGDPS el marco exterior lo forman

En todas las guías el fármaco de primera eleccion en el paciente con DM asintomático es En el algoritmo del anciano en España tras la metfomina es de elección

La dosis máxima eficaz de metformina es de

La prevalencia de diabetes según el estudio di@bet.es en España es del

Según la RedGDPS, una Hb A1c de 8% equivale aproximadamente a una glucemia media de?

En el estudio Steno 2 se demostro que lo mejor para prevenir complicaciones de la diabetes es:

Según la ADA 2015 el objetivo de control de la TA es menor de?

La cifra recomendada por la ADA 2015 para el colestrol total es?

Los antidiabéticos que actuan inhibiendo la reabsorción renal de glucosa son los?

Actúa inhibiendo la absorción intestinal de glucosa

Según el mecanismo de acción de las sulfonilureas son fármacos

La pioglitazona actúa

Un paciente no controlado en monoterapia el siguiente paso normal es....

El efecto de los Inhibidores DPP-4 y GLP esta basado en el efecto conocido como?

El iDPP-4 que se puede utilizar en triple terapia es?

El iDPP4 que no se excreta via renal es?

El estudio TECOS se ha realizado con el IDPP-4

Que MDRD contraindica la utilización real de metformina?

La gliclazida y glimepirida pertenecen al grupo de las?

La repaglinida pertenece al grupo llamado?

La utilización de tiras reactivas se ha relacionado con la disminución de la morbimortalidad cardiovascular. ¿Verdadero o falso?

Los pacientes en tratamiento con insulina deben utilizar para el autocontrol capilar....

En el algoritmo de la redgdps la dieta y el ejercicio están marcadas como....

En el algoritmo de la redGDPS, en la parte inferior quedan reflejadas las entradas según....

En todas las guías el ultimo escalón del tratamiento es...

Cuando la diabetes va evolucionando, la función de la célula Beta va De forma general, la duración del efecto de una insulina basal debería ser alrededor de...

La insulina regular es del tipo de...

De forma general, las insulinas segun su molécula pueden ser Humanas o...

Una insulina 30/70 es

Los análogos rápidos tienen su pico de maxima acción entre las.....

El análogo mas parecido en su curva de acción a la NPH es la insulina

Las insulinas NPH Y NPL utilizan para retardar su efecto la....

La insulina Mix 25 tiene un...

El indice de Minneapolis se utiliza para...

El estudio Elixa es un estudio de seguridad cardiovascular realizado con...

Un estudio famoso realizado en pacientes con diabetes tipo 2 en UK es el

Un estudio famoso realizado con insulina glargina que nos la comparó con NPH es...

Una hipoglucemia asintomática se caracteriza por...

La hipoglucemia severa es...

La retinografía en un paciente bien controlado con una previa normal debe realizarse cada

Cuantos años tras el diagnostico debe indicarse la primera retinografía en el paciente con diabetes tipo 1

El estudio realizado con saxagliptina para demostrar su seguridad cardiovascular es el conocido como

El estudio Examine se realiza para valorar la seguridad cardiovascular de...

Según el estudio de Haffner publicado en 1998, se concluía que el riesgo cardiovascular de los pacientes con DM2 era

Según las tablas Score para diabéticos, el riesgo cardiovascular de estos es...

La recomendación para la utilización de aspirina de la RedGDPS para pacientes con bajo RCV es...