

Tabla de dosis de fármacos en ERC según Filtrado Glomerular.

Realizado según las fichas técnicas, revisado a abril 2024.

Las fichas técnicas pueden verse sometidas a actualizaciones.

Se recomienda revisar ficha técnica.

	FG	> 60	60 - 45	< 45 - 30	< 30 -15	< 15	DIÁLISIS
IDDP4	Metformina	0,5-3 g/día (2-3 tom.)	Máx. 2 g/día	Máx. 1 g/día	Contraindicado		
	Repaglinida	0,5-4 mg/día (3 tomas)					
	Pioglitazona	15-45 mg/día					Contraindicado
	Sitagliptina	100 mg/día		50 mg/día	25 mg/día		
	Vildagliptina	50 mg/12h	FG < 50: 50 mg/día				
Alogliptina	25 mg/día	FG < 50: 12,5 mg/día		6,25 mg/día			
Saxagliptina	5 mg/día		2,5 mg/día			No recomendado	
Linagliptina	5 mg/día						
iSGLT2	Canagliflozina	100 - 300 mg/día	100 mg/día		No recomendado iniciar con FG < 30		
	Dapagliflozina	10 mg/día				No recomendado iniciar con FG < 25	
	Empagliflozina	10 - 25 mg/día	10 mg/día		No recomendado iniciar con FG < 20		
	Ertugliflozina	5 - 15 mg/día		No iniciar	No recomendado		
arGLPI	Liraglutida	1,2 - 1,8 mg/día				No recomendado	
	Dulaglutida	0,7 - 1,5 mg/semana				No recomendado	
	Semaglutida sc	0,25 - 1 mg/semana				No recomendado	
	Semaglutida oral	3 - 14 mg/día				No recomendado	
	Exenatida LAR	2 mg/semana			No recomendado		
	Lixisenatida	10-20 µg/día			No recomendado		
Tirzepatida	5 - 15 mg/día						
Insulina							

IECAS

FG	> 60	60 - 45	< 45 - 30	< 30 -15	< 15	DIÁLISIS
Captopril	FG > 40: 25 - 150 mg/día		FG 21 - 40: 25-100mg/día	FG 10 - 20: 12,5 - 75 mg/día		FG < 10: 6,25 - 37,5 mg/día
Lisinopril	150 - 300 mg/día			FG 10 - 30: 2,5 - 5 mg/día		2,5 mg/día
Enalapril	5 - 40 mg/día	FG 30 - 80: 5 - 10 mg/día		FG 10 - 30: 2,5 mg/día		2,5 mg días de diálisis
Ramipril	2,5 - 10 mg/día	2,5-5mg/día		1,25 mg - 5 mg/día		
Perindopril	4mg/día	2 mg/día		2 mg/48horas		2 mg días de diálisis

ARAII

FG	> 60	60 - 45	< 45 - 30	< 30 -15	< 15	DIÁLISIS
Candesartán	8 - 32 mg/día	4 mg/día				Evitar
Irbesartán	150-300mg/día					75 mg/día
Losartán	12,5 - 150 mg/día					
Olmesartán	10 - 40 mg/día	FG 20 - 60: 10 - 20 mg/día				Evitar
Telmisartán	20 - 80 mg/día				20 mg/día	
Valsartán	40-320mg/día					FG < 10 o diálisis: Evitar

ARNI

FG	> 60	60 - 45	< 45 - 30	< 30 -15	< 15	DIÁLISIS
Sacubitrilo/ valsartán	49/51 mg - 97/103 mg cada 12 horas	Dosis inicial: 24/26 mg cada 12 horas		FG 10 - 30: dosis inicial 24/26 mg cada 12 horas		FG < 10: no recomendado

Calcioantagonistas

FG	> 60	60 - 45	< 45 - 30	< 30 -15	< 15	DIÁLISIS
Amlodipino	5 - 10 mg/día					
Manidipino	10 - 20 mg/día	Precaución al subir de 10 a 20 mg				FG < 10: no recomendado
Lercanidipino	10 - 20 mg/día	Precaución al subir de 10 a 20 mg		Contraindicado		

Betabloqueantes

FG	> 60	60 - 45	< 45 - 30	< 30 -15	< 15	DIÁLISIS
Atenolol	50 - 100 mg/día		FG 35 - 15: 50 mg/día		25 mg/día	50 mg días de diálisis
Bisoprolol	5 - 20 mg/día			FG < 20: 5 - 10 mg/día		
Carvedilol	6,25 - 100 mg/día					
Metoprolol	100 - 400 mg/día					
Nebivolol	1,25 - 10 mg/24h			No recomendado		

		FG	> 60	60 - 45	< 45 - 30	< 30 -15	< 15	DIÁLISIS
ARM	Espironolactona		12,5 - 400 mg/24h	25 mg/días alternos	No recomendado			
	Finerenona		Iniciar 20 mg/día	Iniciar 10 mg/día		No recomendado (FG < 25)		
Diuréticos	Hidroclorotiazida		12,5 - 100 mg/día (1 - 2 tomas)		No recomendado			
	Indapamida		1,5 - 5 mg/día		No recomendado			
	Clortalidona		25 - 200 mg/día		No recomendado			
	Furosemida		20 - 80 mg/día					
	Torasemida		2,5 - 40 mg/día					
Quelantes del k+	Ciclosilicato de sodio y circonio		10 mg/8 horas 2 - 3 días. Dosis de mantenimiento: 5 mg/48 horas a 5 - 10 mg/día					
	Patrómero cálcico		8,4 - 25,2 g/día					
	Poliestirensulfato cálcico		15 g / 6 - 8 horas					
Estatinas y Ezetimiba	Lovastatina		10 - 80 mg/día		No recomendado dosis > 20 mg			
	Simvastatina		5 - 80 mg/día		No recomendado dosis > 10 mg			
	Pitavastatina		1 - 4 mg/día	Precaución utilización		Contraindicada 4 mg		
	Pravastatina		10 - 40 mg/día	Dosis recomendada inicio: 10 mg				
	Rosuvastatina		5 - 40 mg/día	Iniciar 5 mg Contraindicada 40 mg		Contraindicado		
	Fluvastatina		20 - 80 mg/día		Iniciar con dosis < 40 mg			
	Atorvastatina		10 - 80 mg/día					
	Ezetimiba		10 mg/día					
Otros hipolipemiantes	Icosapento de Etilo		1 - 2 g dos veces al día					
	Ácido Bempedoico		180 mg/24 horas		Precaución. Vigilar reacciones adversas			
Inhibidores Xantina Oxidasa	Alopurinol		Iniciar con 100 mg/día		Valorar iniciar con < 100 mg/día o 100 mg a intervalos mayores de 24h		300mg después sesión de diálisis	
	Febuxostat		80 - 120 mg/día		Precaución			