5 Algoritmo ADNIs redGDPS

Fundación redGDPS

Descárgate nuestra ***guía sobre diabetes tipo 2***

1. La elección del fármaco según el condicionante clínico predominante prevalece sobre los valores de HbA1c. En color verde opciones con evidencias en reducción de eventos.

2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción de eventos. En España, los arGLP1 solamente están financiados si IMC > 30 kg/m^2.

3. No asociar iDPP4 con arGLP1; ni SU con repaglinida.

4. Reducir dosis metformina a la mitad si FG < 45 ml/min y suspender si FG < 30 ml/min.

5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min (abril 2020).

6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden prescribir si FG >15 ml/min.

7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica, excepto linagliptina que no requiere ajustes.

8. Se recomienda desintensificar o simplificar los regímenes terapéuticos complejos para reducir el riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.

9. Si IMC > 35kg/m^2 es preferible un arGLP1. Considerar también la cirugía bariátrica.

10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con riesgo de hipoglucemia.

11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses.

12. Gliclazida o glimepirida.

13. Clínica cardinal: poliuria, polidipsia y pérdida de peso.



Objetivo personalizado. Reevaluar cada 3 a 6 meses[11]

ABREVIATURAS

ADNI: antidiabético no insulínico;
arGLP1: análogo de los receptores del péptido similar al glucagón;
CAC: cociente albúmina/creatinina;
CV: cardiovascular;
FG: filtrado glomerular;
GME: glucemia media estimada;
HbA1c: hemoglobina glucosilada;
iDPP4: inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4;
iSGLT2: inhibidor del co-transportador de sodio y glucosa tipo 2;
Met: metformina;
Pio: pioglitazona;
Repa: repaglinida.